



# आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

Quality is Priority

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

## कलिंगड/ खरबूज खत व फवारणी व्यवस्थापन



### खत व्यवस्थापन

| अवस्था                                                                              | खताचे नाव                     | प्रमाण (एकरी) | उद्देश                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| लागवड करण्याअगोदर ५ दिवस                                                            | १) ग्लोरीफर्ट ग्रीन त्यानंतर  | ५०० किलो      | सर्व अन्न द्रव्यांची पूर्तता होण्यासाठी                     |
|                                                                                     | १) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) | २०० किलो      |                                                             |
|                                                                                     | +२) यारामिला कॉम्प्लेक्स      | २५ किलो       |                                                             |
|                                                                                     | +३) बेनसल्फ                   | २० किलो       |                                                             |
|                                                                                     | +४) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड    | २५ किलो       |                                                             |
|                                                                                     | +५) निंबोली पेंड              | १२० किलो      |                                                             |
|                                                                                     | +६) व्होलटॅक्स                | ४ किलो        |                                                             |
| लागवड केल्यानंतर २ दिवसांनी<br>(ट्रॅचींग २०० लिटर पाण्यासाठी)<br>१०० मिली प्रति झाड | १) झेलोरा                     | ८० मिली       | मररोग, झाडाच्या वाढीसाठी, पांढऱ्या मुळीच्या जोमदार वाढीसाठी |
|                                                                                     | +२) १९:१९:१९                  | ८०० ग्रॅम     |                                                             |
|                                                                                     | +३) रूट फास्ट ९८              | २५० ग्रॅम     |                                                             |
| लागवड केल्यानंतर ५ दिवसांनी<br>(ट्रॅचींग २०० लिटर पाण्यासाठी)<br>१०० मिली प्रति झाड | १) १२:६१:००                   | ३ किलो        | अन्न द्रव्ये पूर्ततेसाठी                                    |
|                                                                                     | +२) मॅग्नेशियम सल्फेट         | ३ किलो        |                                                             |
|                                                                                     | +३) अँक्टा                    | २५० ग्रॅम     |                                                             |

|                              |                                                                                                             |                                            |                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| लागवड केल्यानंतर १० दिवसांनी | १) कॅल्शियम नायट्रेट<br>+२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन<br><b>त्यानंतर लगेच</b><br>१) कार्बोबॅक                      | ५ किलो<br>५०० मिली<br><br>१ लिटर           | कॅल्शियम, बोरोन पूर्तता व अन्नद्रव्ये अपटेक साठी                   |
| लागवड केल्यानंतर १५ दिवसांनी | १) १९:१९:१९<br>+२) इन्स्टा बिऑन<br><b>त्यानंतर लगेच</b><br>१) इन्स्टाचिल झिंक<br>+२) डॉ. बॅक्टीज बॅक्टी कीट | ३ किलो<br>१ लिटर<br><br>५०० ग्रॅम<br>१ कीट | झाडाची वाढ होण्यासाठी, मुळीच्या विकासासाठी, अन्नद्रव्ये अपटेक साठी |
| लागवड केल्यानंतर २० दिवसांनी | १) १३:४०:१३<br>+२) मॅग्नेशियम सल्फेट<br><b>त्यानंतर लगेच</b><br>सल्फर ९०%                                   | ५ किलो<br>३ किलो<br><br>३ किलो             | मुळीचा विकास, अन्नद्रव्ये अपटेक साठी                               |
| लागवड केल्यानंतर २५ दिवसांनी | १) १२:६१:००<br>+२) ००:००:५०<br>+३) लिग्नो फर्ट                                                              | ३ किलो<br>२ किलो<br>१ लिटर                 | अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी                                   |
| लागवड केल्यानंतर २६ दिवसांनी | १) डॉ. बॅक्टीज डरमस 4K<br>+२) डॉ. बॅक्टीज फ्लुरो 4K                                                         | ५०० ग्रॅम<br>५०० ग्रॅम                     | मररोग, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण                                      |
| लागवड केल्यानंतर ३० दिवसांनी | १) ००:५२:३४<br>+२) डॉ. ऑर्थोसील                                                                             | ५ किलो<br>५०० मिली                         | अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी                                   |
| लागवड केल्यानंतर ३५ दिवसांनी | १) टफ फाईट-९०%<br>+२) स्लेयर प्रो.                                                                          | १ किलो<br>५०० मिली                         | मररोग, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण                 |
| लागवड केल्यानंतर ४० दिवसांनी | १) हायब्रीड कॅल्शिओ<br>+२) इन्स्टा बोर                                                                      | २ किलो<br>२५० ग्रॅम                        | अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी                                            |
| लागवड केल्यानंतर ४५ दिवसांनी | १) ००:६०:२०<br>+२) मॅग्नेशियम सल्फेट<br><b>त्यानंतर लगेच</b><br>१) डॉ. बॅक्टीज बॅक्टी कीट                   | ५ किलो<br>५ किलो<br><br>१ कीट              | अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी                                            |
| लागवड केल्यानंतर ५० दिवसांनी | १) १३:००:४५<br>+२) हायब्रीड कॅल्शिओ<br>+३) इन्स्टा बोरोलॅमाईन                                               | ५ किलो<br>२ किलो<br>५०० मिली               | फळफुगवणीसाठी अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी व अपटेक साठी                  |
| लागवड केल्यानंतर ५१ दिवसांनी | १ बी.एस.बॅक्टीज पी डॉ( 4K<br>+२) डॉ. बॅक्टीज के.एम.बी. 4K                                                   | १ किलो<br>१ किलो                           | पोटॅश, फॉस्फरस पूर्तता, फळाच्या फुगवणीसाठी                         |
| लागवड केल्यानंतर ५५ दिवसांनी | १) पोर्टॅशियम शोनाईट<br>+२) सी रूबी                                                                         | ५ किलो<br>५०० मिली                         | सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता ,फळफुगवणीसाठी,अन्नद्रव्ये अपटेक साठी   |
| लागवड केल्यानंतर ५८ दिवसांनी | १) टफ फाईट ९०%<br>+२) डॉ. बॅक्टीज फ्लुरो 4K                                                                 | ५०० ग्रॅम<br>१ किलो                        | मररोग,बुरशीजन्य रोग नियंत्रण                                       |
| लागवड केल्यानंतर ६० दिवसांनी | १) पोर्टॅशियम शोनाईट<br>+२) इन्स्टा फर्ट ड्रीप<br>+३) रिक्वायटल-एफ                                          | ५ किलो<br>२ किलो<br>५०० ग्रॅम              | फळामध्ये साखर भरणे,वजन वाढीसाठी                                    |

## फवारणी व्यवस्थापन

| अवस्था                                                        | पावडरचे नाव                                                                    | प्रमाण (२०० लिटर पाण्यासाठी )                        | उद्देश                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| लागवडीच्या दिवशी ( नर्सरीतून आणलेल्या रोपांची ट्रे ट्रीटमेंट) | १) बाविस्टीन<br>+२) अँट्रा<br>+३) रूट फास्ट                                    | १ ग्रॅम / लिटर<br>०.५ ग्रॅम / लिटर<br>१ ग्रॅम / लिटर | मररोग व रसशोषक किड नियंत्रणासाठी                                                      |
| लागवड केल्यानंतर ३ दिवसांनी                                   | १) लॅसेटा<br>+२) अँट्राकॉल<br>+३) डॉ. ऑर्थोसील                                 | ४० ग्रॅम<br>५०० ग्रॅम<br>२५० मिली                    | पांढरी माशी, नागअळी, पाने खाणारे भुंगे, तसेच बुरशीजन्यरोग नियंत्रण                    |
| लागवड केल्यानंतर ८ दिवसांनी                                   | १) अँट्राकॉल<br>+२) सोलोमन<br>+३) क्रॉप टॉनिक २१<br>+४) चिलेटेड झिंक           | ५०० ग्रॅम<br>१५० मिली<br>५० मिली<br>१०० ग्रॅम        | झाडाची वाढ होणे, पांढरी माशी, नागअळी, पाने खाणारे भुंगे, तसेच बुरशीजन्यरोग नियंत्रण   |
| लागवड केल्यानंतर १५ दिवसांनी                                  | १) व्हायरोबॅन<br>+२) अँसिटामाप्रीड २०%<br>+३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी               | ५०० मिली<br>१०० ग्रॅम<br>१०० ग्रॅम                   | व्हायरस नियंत्रण                                                                      |
| लागवड केल्यानंतर २० दिवसांनी                                  | १) प्रोक्लेम<br>+२) कंट्रोल टी.आर.एम<br>+३) स्कोर                              | १०० ग्रॅम<br>४०० मिली<br>१०० मिली                    | रस शोषक किड, अळी, तसेच भुरी रोग नियंत्रण                                              |
| लागवड केल्यानंतर २४ दिवसांनी                                  | १) अँमिकॅल<br>+२) डॉ. ऑर्थोसील<br>+३) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम<br>+४) इन्स्टा बोर | २०० ग्रॅम<br>२५० मिली<br>१०० ग्रॅम<br>१०० ग्रॅम      | पानांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच फुलकळी लागण्यास मदत, पानांना काळोखी येण्यासाठी |
| लागवड केल्यानंतर २८ दिवसांनी                                  | १) ट्रेसर<br>+२) स्कोर<br>+३) क्रॉप टॉनिक २१                                   | ७५ मिली/ एकरी<br>१०० मिली<br>५० मिली                 | फळमाशी, रसशोषक कीड, भुरी रोग नियंत्रण, झाडाच्या वाढीसाठी                              |
| लागवड केल्यानंतर ३० दिवसांनी                                  | १) टफ फाईट ९०%<br>+२) डॉ. ऑर्थोसील                                             | ४०० ग्रॅम<br>२५० मिली                                | अन्न द्रव्ये पूर्तता साठी                                                             |
| लागवडीनंतर ३२ दिवसांनी                                        | १) ताक<br>+२) हिंग<br>+३) गुळ<br>+४) दालचिनी                                   | ३ लिटर<br>५० ग्रॅम<br>२०० ग्रॅम<br>५ ग्रॅम           | मित्र किटक, मधमाशी शेतात आकर्षित होण्यासाठी                                           |
| लागवड केल्यानंतर ३५ दिवसांनी                                  | १) अँमिकॅल<br>+२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन<br>+३) स्केल अप                           | २०० ग्रॅम<br>१०० मिली<br>१०० मिली                    | फळ सेटिंग व फुगवण होण्यासाठी                                                          |
| लागवड केल्यानंतर ४० दिवसांनी                                  | १) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम.५६<br>+२) अँसिटामाप्रीड २०%<br>+३) सेक्युर           | १ कार्टन / एकरी<br>१०० ग्रॅम<br>२०० मिली             | अळी, तसेच भुरी व बुरशीजन्यरोग नियंत्रण                                                |

|                              |                                                                 |                                               |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| लागवड केल्यानंतर ४५ दिवसांनी | १) अॅमिकॅल<br>+२) इन्स्टा बोर<br>+३) ६ बी.ए<br>+४) साईज फास्ट   | २०० ग्रॅम<br>१०० ग्रॅम<br>३ ग्रॅम<br>४०० मिली | फळ सेटिंग व फुगवण होण्यासाठी                                                      |
| लागवड केल्यानंतर ५० दिवसांनी | १) टफ फाईट १०%<br>+२) टायमर                                     | ५०० ग्रॅम<br>४०० मिली                         | डावणी, भुरी नियंत्रण, पाने टिकवण्यासाठी                                           |
| लागवड केल्यानंतर ५५ दिवसांनी | १) सोलोमन<br>+२) बावीरतीन<br>+३) सेक्युर<br>+४) डॉ. ऑर्थोसिल    | १०० मिली<br>२०० ग्रॅम<br>२०० मिली<br>२५० मिली | फळमाशी, रसशोषक कीड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण                               |
| लागवड केल्यानंतर ६० दिवसांनी | १) कॉन्टाफ<br>+२) इन्स्टाचिल कॅल्शियम<br>+३) इन्स्टा बोरोलॅमाईन | २०० मिली<br>२०० ग्रॅम<br>१०० मिली             | भुरी रोग नियंत्रण, फळांना तडे जाऊ नये म्हणून                                      |
| लागवड केल्यानंतर ६४ दिवसांनी | १) सुपर कॉन्फिडोर<br>+२) झेड ७८<br>+३) बोल्ड साईज               | ५० मिली<br>४०० ग्रॅम<br>२०० मिली              | शेवटच्या टप्प्यातील फळमाशी, रसशोषक कीड नियंत्रणासाठी, बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी |
| लागवड केल्यानंतर ६८ दिवसांनी | १) के - ह्योडो<br>+२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन                        | ५० ग्रॅम / एकरी<br>१०० मिली                   | फळामध्ये साखर भरणेसाठी, रंग येण्यासाठी वजन वाढीसाठी                               |
| लागवड केल्यानंतर ७५ दिवसांनी | १) के - ह्योडो<br>+२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन                        | ५० ग्रॅम / एकरी<br>१०० मिली                   | फळामध्ये साखर भरणेसाठी, रंग येण्यासाठी वजन वाढीसाठी                               |

- फवारणीच्या पाण्याचा सामू (PH), टी.डी.एस. ,ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी करावा.
- पावसाळी वातावरण, दव,धुके असताना करावायच्या फवारणी मध्ये आनंदवेट गोल्ड -०.२ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी वापर करावा.
- टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.



सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

www.anandagrocure.com  
9404669664 | 9405125664

ANAND  
CROP GURU



Get it on Google Play

सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या फेसबुक ग्रुप मधून डाउनलोड करू शकतात. anandagrocure

