



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

सीताफल पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
फल काढणी नंतर / ताणावर सोडण्याअगोदर	1) ग्लोरीफर्ट प्रोम +2) डॉ.बॅक्टीज NPK गोल्ड +3) डॉ. बॅक्टीज पंचम गोल्ड	200 किलो 4 किलो 25 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
फल काढणी नंतर / ताणावर सोडण्याअगोदर	1) डॉ. बॅक्टीज व्ही.बी.एम 4K +2) डॉ. बॅक्टीज डरमस 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	मिलीबग व किडींचे कोष व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
छाटणीच्या दिवशी	1) 13:40:13 +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) रूट फास्ट	5 किलो 2 किलो 1 किलो	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
छाटणी नंतर 8 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कित	1 लिटर 1 कित	अन्नद्रव्ये अपटेक तसेच सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी

छाटणी नंतर 15 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) लिग्नो फर्ट	7 किलो 3 किलो 1 लिटर	फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अन्नद्रव्यांचा अपटेक होण्यासाठी.
छाटणी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम 4K	1 किलो	मिलीबग नियंत्रण
छाटणी नंतर 30 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर +3) रिह्वायटल-एफ	2 किलो 250 ग्रॅम 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे व अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
छाटणी नंतर 40 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) डॉ. ऑर्थोसील	5 किलो 3 किलो 500 ग्रॅम	साईज होण्यासाठी अन्नद्रव्यांची पूर्तता.
छाटणी नंतर 50 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) लिग्नो फर्ट	5 किलो 2 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता व अपटेक साठी
छाटणी नंतर 55 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	1 लिटर 1 किट	अन्नद्रव्ये अपटेक तसेच सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी
छाटणी नंतर 60 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +3) रिह्वायटल-एफ	2 किलो 500 मिली 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे व अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
छाटणी नंतर 70 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) डॉ. ऑर्थोसील	5 किलो 3 किलो 500 ग्रॅम	साईज होण्यासाठी अन्नद्रव्यांची पूर्तता.
छाटणी नंतर 80 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज के.एम.बी 4K +2) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	पोटॅश अपटेक साठी
छाटणी नंतर 90 दिवसांनी	1) पोर्टेशियम शोनाईट +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी.
छाटणी नंतर 120 दिवसांनी	1) पोर्टेशियम शोनाईट +2) लिग्नो फर्ट	5 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी.

फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	पावडरचे नाव	प्रमाण (200 लिटर साठी)	उद्देश
छाटणी अगोदर 5 दिवस	1) नॅनो शिल्ड	500 मिली	बुरशीजन्य व जीवाणुजन्य रोग नियंत्रण
छाटणीच्या दिवशी	1) चुना किंवा 1) इन्स्टंट चुना +2) मोरचूद +3) सल्फर +4) आनंद-वेट गोल्ड	1 किलो 500 ग्रॅम 1 किलो 250 ग्रॅम 30 मिली	बुरशीजन्य व जीवाणुजन्य रोग नियंत्रण
छाटणीनंतर 5 दिवसांनी	1) अफ्लॉड +2) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम. 4K	300 मिली 250 ग्रॅम	मिली बग नियंत्रण टीप : खोड व फांडा धुवून घ्याव्या.

छाटणीनंतर 12 दिवसांनी	1) बावीस्टीन +2) अँक्ट्रा +3) प्रेगा फास्ट	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 500 मिली	बुरशीजन्य रोग, थ्रीप्स नियंत्रण व फुलधारणा होण्यासाठी
छाटणीनंतर 20 दिवसांनी	1) प्रोक्लेम +2) अँमिक्कॅल +3) इन्स्टा बोर +4) डॉ.ऑर्थोसील	100 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 250 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण व अन्नद्रव्ये पूर्तता
छाटणीनंतर 25 दिवसांनी	1) रोको +2) डेलिगेट +3) ब्रिलीयंट	200 ग्रॅम 120 मिली 500 मिली	मिली बग नियंत्रण व रसशोषक कीड नियंत्रण.
छाटणीनंतर 35 दिवसांनी	1) प्रोक्लेम +2) अँमिक्कॅल +3) इन्स्टा बोर +4) स्केल अप	100 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	फुलगळ नियंत्रण, सेटिंग होण्यासाठी तसेच करपा, अळी व रसशोषक किडी नियंत्रण
छाटणीनंतर 45 दिवसांनी	1) बावीस्टीन +2) डेलिगेट +3) स्केल अप	200 ग्रॅम 120 मिली 200 मिली	करपा, अळी व रसशोषक किडी नियंत्रणासाठी
छाटणीनंतर 60 दिवसांनी	1) अँन्ट्राकॉल +2) प्रोक्लेम +3) कंट्रोल टी.आर.एम	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 300 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण
छाटणीनंतर 65 दिवसांनी	1) रोको +2) अँमिक्कॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) साईज फास्ट	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 मिली 400 मिली	फळांची कुज थांबून साईज होण्यासाठी
छाटणीनंतर 75 दिवसांनी	1) मिओथ्रीन +2) आनंदवेट गोल्ड	200 मिली 20 मिली	फळमाशी नियंत्रण
छाटणीनंतर 80 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) अँमिक्कॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) साईज फास्ट	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 मिली 400 मिली	फळांची कुज थांबून साईज होण्यासाठी
छाटणीनंतर 90 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम 4K +2) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K	250 ग्रॅम 250 ग्रॅम	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण.
छाटणीनंतर 100 दिवसांनी	1) के-होडो +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	100 ग्रॅम 100 मिली	फळांचा विकास होण्यासाठी टीप : १५ दिवसांच्या अंतराने दुसरी फवारणी घ्यावी.



पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.
टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664 | 9405125664



ANAND
CROP GURU



GET IT ON
Google Play

सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocure.com