



Quality is Priority

ANAND AGRO CARE®

Total Crop Care

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

टमाटर उर्वरक एवं छिड़काव प्रबंधन



उर्वरक प्रबंधन

फसल की अवस्था	उर्वरक का नाम	प्रति एकड़ मात्रा	उद्देश्य
फसल की अवस्था	1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) यारामिला कॉम्प्लेक्स +3) 09:24:24 +4) एटोसिल +5) बेनसल्फ +6) डॉ. बॅक्टीज NPK गोल्ड +7) डॉ. बॅक्टीज पंचम गोल्ड	10 बैग 25 किलो 80 किलो 50 किलो 25 किलो 4 किलो 10 किलो	बेसल डोज के माध्यम से पोषक तत्व प्रदान करना ।
रोपाई से पहले	1) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +2) डॉ. बॅक्टीज फलूरो 4K	500 ग्राम 500 ग्राम	डैम्पिंग ऑफ (पौध गलन) को नियंत्रित करने के लिए (ड्रैचिंग) ।
रोपाई के 2 दिन बाद	1) 19:19:19 +2) मैग्नीशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	2 किलो 1 किलो 500 ग्राम	पौध स्थापना और सफेद जड़ों के विकास को बढ़ावा देने के लिए (ड्रैचिंग) ।
रोपाई के 4 दिन बाद	1) 11:36:24 +2) इन्स्टा बिऑन	1 किलो 500 मिली	पार्श्व शाखाओं और वानस्पतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए (ड्रैचिंग) ।

रोपाई के 6 दिन बाद	1) वोलीयाम फ्लेक्झी +2) आनंदवेट गोल्ड	200 मिली 100 मिली	रस चूसने वाले कीटों और लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए ।
रोपाई के 8 दिन बाद	1) कार्बोबैंक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	1 लीटर 1 किट	पार्श्व शाखाओं और सफेद जड़ों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 12 दिन बाद	1) मैग्नीशियम सल्फेट +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) डॉ. ऑर्थोसील	3 किलो 2 किलो 500 मिली	हरियाली बढ़ाने, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने और पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 14 दिन बाद	1) 14:48:00 +2) इन्स्टा बिऑन	2 किलो 1 लीटर	पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने और पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 16 दिन बाद	1) 12:61:00 +2) लिग्नोफर्ट	3 किलो 500 मिली	वृद्धि और पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 20 दिन बाद	1) 00:42:47 +2) रिवायटल एफ	3 किलो 500 ग्राम	पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने और पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 25 दिन बाद	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्राम	फूल आने (Flowering) को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 30 दिन बाद	1) 13:40:13 +2) मैग्नीशियम सल्फेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप	5 किलो 2 किलो 2 किलो	हरियाली और फलों के लगने (fruit setting) को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 35 दिन बाद	1) टफ फ़ाईट 90 +2) डॉ. ऑर्थोसील	1 किलो 500 मिली	मुरझान (wilt) को नियंत्रित करने और पौधों के तनाव को कम करने के लिए ।
रोपाई के 40 दिन बाद	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट +2) डॉ. बॅक्टोज बायोड्रिंक 4K	1 किट 500 ग्राम	पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 45 दिन बाद	1) 00:52:34 +2) रिवायटल एफ	5 किलो 500 ग्राम	फलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 50 दिन बाद	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्राम	फलों को फटने से बचाने और 'ब्लॉसम एंड रॉट' को रोकने के लिए ।
रोपाई के 55 दिन बाद	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) लिग्नोफर्ट	4 किलो 4 किलो 500 मिली	पोषक तत्व प्रदान करने और उनके अवशोषण को बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 60 दिन बाद	1) पोटेशियम शोनाइट +2) सी रूबी पाउडर	5 किलो 500 ग्राम	फलों के आकार, रंग, आकार और परिपक्वता में सुधार के लिए ।

छिड़काव प्रबंधन

फसल की अवस्था	उत्पाद का नाम	मात्रा 200 लीटर पानी	उद्देश्य
रोपाई के 4 दिन बाद	1) कार्बेन्डाजिम 50% डब्लू पी +2) लैम्ब्डा साइहलोथिन 5% ईसी +3) डॉ.आनंद नीम 1%	200 ग्राम 150 मिली 200 मिली	अगेती झुलसा, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और अन्य रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए ।
रोपाई के 8 दिन बाद	1) जिनेब 75% WP +2) थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्ब्डा-साइहलोथिन 9.5% जेडसी +3) इंस्टाफर्ट कॉम्बी	400 ग्राम 150 मिली 150 ग्राम	झुलसा, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और अन्य रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए ।
रोपाई के 12 दिन बाद	1) प्रोपीनेब 70% डब्लूपी +2) कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी +3) डॉ. ऑर्थोसिल	400 ग्राम 200 ग्राम 250 मिली	कवक रोगों, लीफ माइनर को नियंत्रित करने और अजैविक तनाव को कम करने के लिए ।
रोपाई के 16 दिन बाद	1) कार्बेन्डाजिम 50% डब्लू पी +2) बीटा-साइफ्लुथ्रिन 8.49% + इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी +3) सी रूबी ग्रीन +4) 11:36:24	200 ग्राम 150 मिली 500 मिली 500 ग्राम	झुलसा, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, लीफ माइनर के नियंत्रण और पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 18 दिन बाद	1) प्रोपिक्लोनाज़ोल 13.9% + डिफेनोकोनाज़ोल 13.9% ईसी +2) ज़िरम 27% एसएल +3) 00:52:34	80 मिली 400 मिली 500 ग्राम	अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि कम करने और पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 20 दिन बाद	1) वायरोबन +2) इंस्टाफर्ट कॉम्बी +3) एसिटामैप्रिड 20%	500 मिली 150 ग्राम 100 ग्राम	लीफ कर्ल, मोजेक वायरस और सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए ।
रोपाई के 23 दिन बाद	1) प्रोपिनेब 70% डब्लूपी +2) एबामेक्टेन 1.9% +3) टोमेंटो स्पेशल	400 ग्राम 100 मिली 300 मिली	झुलसा, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, लीफ माइनर के नियंत्रण और पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 26 दिन बाद	1) टफ फ़ाईट 90% +2) इंस्टाचेल कॉपर +3) डॉ. माइसीन	500 ग्राम 100 ग्राम 200 मिली	बैक्टीरिया जनित झुलसा को नियंत्रित करने के लिए ।
रोपाई के 30 दिन बाद	1) अमीकैल +2) इंस्टा बोरोलैमाइन +3) क्रॉप टॉनिक +4) डॉ. ऑर्थोसिल	200 ग्राम 100 मिली 50 मिली 250 मिली	फूल आने को बढ़ावा देने और पत्तियों की मजबूती एवं दक्षता बढ़ाने के लिए ।
रोपाई के 32 दिन बाद	1) डायफेनकोनाज़ोल 25% एससी +2) क्लोरोथालोनिल 75% डब्लूपी +3) इमामेक्टेन बेजोएट 5% एसजी	100 मिली 250 ग्राम 100 ग्राम	कवक रोग और थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए ।

रोपाई के 35 दिन बाद	1) वायरोबन +2) इंस्टाफर्ट कॉम्बी +3) एसिटामैप्रिड 20%	500 मिली 150 ग्राम 100 ग्राम	लीफ कर्ल, मोजेक वायरस और सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए ।
रोपाई के 38 दिन बाद	1) ट्राइसाइक्लाजोल 18% + मैकोजेब 62% डब्लूपी +2) पाइरिप्रोक्सीफेन 5% + डायफेंथियुरोन 25% एसई +3) टोमॅटो स्पेशल	400 ग्राम 300 मिली 300 मिली	सफेद मक्खी, झुलसा नियंत्रण, फूल आने और फल लगने के लिए ।
रोपाई के 42 दिन बाद	1) थायोफिनेट मिथाइल 70% WP +2) अमीकैल +3) इंस्टा बोरोलैमाइन +4) स्केल अप	200 ग्राम 200 ग्राम 100 मिली 100 मिली	फूलों का झड़ना कम करने और फल लगने को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 45 दिन बाद	1) क्रेसॉक्सिम-मिथाइल 15% + क्लोरोथालोनिल 56% डब्लूजी +2) क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 9.3% + लैम्ब्डा साइहलोग्रिन 4.6% जेडसी +3) क्रॉप टॉनिक	300 ग्राम 100 मिली 50 मिली	अगेती और पछेती झुलसा, फल छेदक नियंत्रण और फल लगने को बढ़ावा देने के लिए ।
रोपाई के 50 दिन बाद	1) इप्रोवालिकर्ब 5.5% + प्रोपिनेब 61.25% डब्लूपी +2) थियामेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी +3) साइज फास्ट	400 ग्राम 80 मिली 400 मिली	झुलसा, रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण और फल का आकार सुधारने के लिए ।
रोपाई के 55 दिन बाद	1) एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डिफेनोकोनाजोल 11.4% एससी +2) इमामेक्तिन बेंजोएट 5% + लुफेनुरॉन 40% +3) टोमॅटो स्पेशल	100 मिली 24 ग्राम 400 मिली	कवक रोगों, रस चूसने वाले कीटों, फल छेदक नियंत्रण और फूल आने में सुधार के लिए ।
रोपाई के 60 दिन बाद	1) के रोडो +2) इंस्टा बोरोलैमाइन	50 ग्राम 100 मिली	फलों के विकास में सुधार के लिए ।

नोट: यह प्रबंधन पत्रिका हमारे विशेषज्ञों, मौसम तथा फसल की स्थिति के अध्ययन पर आधारित है। इस प्रबंधन पत्रिका का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए इसके उपयोग के संबंध में हम किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते।

सभी फसलों का मुफ्त मार्गदर्शन पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें
आनंद क्रॉप गुरु ऐप।

 **9404669664**
 **9405125664**

 **ANAND
CROP GURU**



You can download this schedule from our website. | www.anandagrocure.com

